

Instrukcja używania

Należy uważnie przeczytać.

junior-angin lizaki na ból gardła dla dzieci, o smaku truskawkowym

Chronią błonę śluzową jamy ustnej i gardła,
szczególnie w przypadku bólu gardła.

1. Czym są lizaki junior-angin i kiedy się je stosuje?

junior-angin lizaki to wyrób medyczny chroniący błonę śluzową jamy ustnej i gardła, szczególnie u pacjentów z bólem gardła.

Podczas ssania składniki lizaków junior-angin łagodzą podrażnioną błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Porost islandzki tworzy na błonie śluzowej warstwę ochronną, która pełni rolę naturalnej bariery przed bólem i wnikaniem drobnoustrojów.

Pantotenian wapnia wspomaga ochronną funkcję porostu islandzkiego poprzez nawilżenie podrażnionego gardła.

Proces ssania stymuluje wydzielanie śliny, dzięki czemu składniki lizaka równomiernie pokrywają błonę śluzową jamy ustnej i gardła.

2. Jaki jest skład lizaków junior-angin?

Jeden lizak junior-angin zawiera:

wyciąg z porostu islandzkiego, pantotenian wapnia, kwas askorbinowy, sacharozę, syrop glukozowy, kwas cytrynowy, aromat truskawkowy i koncentraty (jabłko, czarna porzeczka, rzodkiew).

3. Jak stosować lizaki junior-angin?

Lizak należy ssać powoli co 2–3 godziny, w razie potrzeby – nie należy przekraczać liczby 3 lizaków w ciągu dnia.

Opakowanie zawiera 8 lizaków junior-angin.

Stosować wyłącznie u dzieci powyżej 3. roku życia, które potrafią bezpiecznie i samodzielnie ssać lizaki.

W czasie ssania lizaka nie należy biegać i skakać ze względu na ryzyko urazu.

Należy zawsze ściśle przestrzegać instrukcji dotyczącej stosowania lizaków junior-angin. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 2–3 dni lub nasilają się, należy skonsultować się z lekarzem.

4. Kiedy nie wolno stosować lizaków junior-angin?

Lizaków junior-angin nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

5. Kiedy zalecana jest ostrożność przy stosowaniu lizaków junior-angin?

Przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem nie ma potrzeby zachowywania szczególnych środków ostrożności. Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o ewentualnych chorobach, uczuleniach albo o zażywaniu leków (również tych kupowanych bez recepty).

6. Jaki jest okres ważności lizaków junior-angin?



Data ważności **lizaków junior-angin** jest wydrukowana na opakowaniu. Nie należy stosować **lizaków junior-angin** po upływie terminu ważności.

7. Na co jeszcze należy zwrócić uwagę?

Lizaki junior-angin należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Data aktualizacji instrukcji: maj 2018

Wyrób medyczny dostępny wyłącznie w aptekach



HCS HealthCare Supply GmbH
Schwester-Zita-Weg 11
52080 Aachen
Niemcy

Dystrybutor: M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa

