

INSTRUKCJA UŻYWANIA: NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ

junior-angin

SYROP DLA DZIECI o smaku czereśniowym

Droga Pacjentko, drogi Pacjencie!

Należy przeczytać uważnie całą instrukcję używania. Jeśli potrzebne są dodatkowe informacje lub porady, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Spis treści instrukcji:

1. W jakim celu stosuje się junior-angin syrop dla dzieci?
2. Co zawiera junior-angin syrop dla dzieci?
3. Co trzeba wiedzieć przed zastosowaniem junior-angin syrop dla dzieci?
4. Jak stosować junior-angin syrop dla dzieci?
5. Co zrobić w przypadku zażycia większej niż zalecana dawki junior-angin syrop dla dzieci?
6. Jak przechowywać junior-angin syrop dla dzieci i jaki jest jego termin ważności?
7. Inne informacje

1. W jakim celu stosuje się junior-angin syrop dla dzieci?

junior-angin syrop dla dzieci jest zalecany do stosowania w suchym, drażniącym kaszlu, w bólu gardła oraz w przypadku podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej i gardła, towarzyszącym przeziębieniom.

2. Co zawiera junior-angin syrop dla dzieci?

100 ml syropu zawiera m.in.:

5 g wyciągu z porostu islandzkiego

5 g wyciągu z malwy

Porost islandzki stosowany jest w bólu gardła oraz suchym, drażniącym kaszlu ze względu na zawarte w nim substancje śluzowe, wykazujące działanie łagodzące podrażnienia, które niczym balsam powlekają błonę śluzową gardła i jamy ustnej.

Malwa stosowana jest w podrażnieniach błony śluzowej jamy ustnej i gardła oraz w związanych z nimi bólem gardła i suchym, drażniącym kaszlem. Liście i kwiaty malwy zawierają substancje śluzowe, które wykazują działanie łagodzące.

Pozostałe składniki:

Glukonian cynku, sorbinian potasu, roztwór maltitolu, aromat czereśniowy, aromat ziół przeciwkaszlowych, woda oczyszczona.

Nie zawiera alkoholu i cukru.

Nie zawiera: sztucznych barwników, laktozy, glutenu.

3. Co należy wiedzieć przed zastosowaniem junior-angin syrop dla dzieci?

Kiedy nie stosować junior-angin syrop dla dzieci

- jeśli występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu

- jeśli występuje nietolerancja substancji słodzącej maltitolu.

Cięża i karmienie piersią

Brak danych na temat stosowania przez kobiety w okresie ciąży i laktacji. Przed zastosowaniem należy zasięgnąć porady lekarza.

Interakcje

Brak danych dotyczących interakcji.

4. Jak stosować junior-angin syrop dla dzieci?

junior-angin syrop dla dzieci należy stosować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci od 1 do 6 lat:

W zależności od potrzeby 1 raz do 2 razy dziennie po 5ml junior-angin syrop dla dzieci

Dzieci i młodzież od 6 do 16 lat:

2 razy dziennie po 10ml junior-angin syrop dla dzieci

Brak danych na temat stosowania junior-angin syrop dla dzieci u dzieci poniżej 1. roku życia. Przed podaniem preparatu dzieciom w tej grupie wiekowej, należy skonsultować się z lekarzem.

Regularne przyjmowanie preparatu

Regularne i zgodne z zaleceniami stosowanie junior-angin syrop dla dzieci ma decydujące znaczenie dla powodzenia kuracji. Dla podtrzymania efektów zaleca się kontynuowanie stosowania junior-angin syrop dla dzieci jeszcze przez 2 – 3 dni po ustąpieniu objawów.

Czas stosowania preparatu

junior-angin syrop dla dzieci może być w razie potrzeby stosowany przez dłuższy czas. Jeżeli po jednym tygodniu stosowania dolegliwości utrzymują się lub wręcz się nasilają, należy skontaktować się z lekarzem.

Inne wskazówki

W celu dokładnego dozowania należy stosować załączony kieliszek z miarką. Praktyczny dozownik w szyjce butelki ułatwia nalewanie i pozwala uniknąć osadzania się lępkich resztek na butelce.

5. Co zrobić w przypadku zażycia większej niż zalecana dawki junior-angin syrop dla dzieci?

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki junior-angin syrop dla dzieci, należy skontaktować się z lekarzem.

6. Jak przechowywać junior-angin syrop dla dzieci i jaki jest jego termin ważności?

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Termin ważności tego produktu zamieszczony jest na opakowaniu tekturowym oraz na etykiecie butelki.

Nie stosować produktu po upływie podanego terminu ważności.

Po otwarciu spożyć produkt w ciągu 2 tygodni.

Przechowywać w miejscu suchym w temperaturze do 25 °C.

7. Inne informacje

Zawartość

100 ml syropu do stosowania doustnego.

Wielkość opakowania

Butelka zawierająca 100 ml syropu

Data zatwierdzenia instrukcji

lipiec 2017



Wyrób medyczny



Wytwórca

MPC International S.A.

26, Boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

Dystrybutor

M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2

01-209 Warszawa

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

intbusiness@klosterfrau.de

Ty też zaufaj leczniczym siłom natury.

Więcej informacji o poroście islandzkim i malwie

Nazwa porost islandzki pochodzi z 17. wieku, kiedy to w Islandii po raz pierwszy zastosowano porost islandzki jako roślinę leczniczą. Wbrew temu co sugeruje nazwa, porost islandzki rośnie nie tylko na Islandii lecz występuje bardzo pospolicie także w wielu krajach Europy Środkowej i Północnej.

Malwa jest jedną z najstarszych znanych roślin użytkowych i już w czasach antycznych uprawiana była do celów spożywczych i leczniczych. Ojczyzną malwy dziekiej jest Azja i Europa Południowa. Dziś roślina ta występuje szeroko w całej Europie Południowej i Środkowej, ekspandując coraz dalej w kierunku północnym do Środkowej Szwecji i Południowej Norwegii.

Zastosowanie w medycynie ludowej

Zastosowanie porostu islandzkiego (łac. lichen islandicus) ma długą tradycję. Medycyna ludowa wykorzystuje tę roślinę przy podrażnieniach błony śluzowej górnych dróg oddechowych, ze względu na zawarte w niej balsamiczne substancje śluzowe. Rozpuszczony w syropie lub zawarty w tabletkach porost islandzki rozprawdza się w jamie ustnej i gardle jak kojący balsam.

Malwa także zawiera substancje śluzowe, które dodatkowo umacniają tworzącą się warstwę ochronną. Najczęściej wykorzystywane są liście i płatki kwiatów malwy.

Substancje śluzowe tworzą warstwę ochronną na błonie śluzowej i działają łagodząco.

W ziołolecznictwie wyciągi z tej rośliny stosuje się przy podrażnieniach jamy ustnej i gardła, a także przewodu pokarmowego. Znajdują również zastosowanie w stanach przeziębienia i suchym, drażniącym kaszlu.

Działanie

Porost islandzki i malwa chronią błonę śluzową przed szkodliwymi wpytami otoczenia. Szczególnie w chłodnych miesiącach zimowych, w otaczającym nas powietrzu znajdują się liczne drobnoustroje chorobotwórcze. Dla zdrowej błony śluzowej obrona przed szkodliwymi mikroorganizmami nie stanowi żadnego problemu. Jeśli jednak błona śluzowa jest podrażniona i osłabiona, bakterie i wirusy mogą bez przeszkód zaatakować organizm.

junior-angin syrop dla dzieci dzięki zawartości porostu islandzkiego i malwy wytwarza podwójną warstwę ochronną na błonie śluzowej, przez co chroni ją przed podrażnieniami. W przypadku, gdy błona śluzowa została już zaatakowana, może się ona szybciej zregenerować i odzyskać pierwotne siły obronne (odporność).

Bardzo dobra tolerancja przez organizm

junior-angin syrop dla dzieci jest bardzo dobrze tolerowany przez organizm, w związku z czym można go zażywać równocześnie z innymi produktami.

junior-angin syrop dla dzieci nadaje się do stosowania nawet przez osoby o wrażliwym żołądku.

Dzieci bardzo lubią pyszny owocowy smak syropu junior-angin dla dzieci.